

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Antikataraktikum N 1,0 mg/ml Augentropfen

Wirkstoff: Inosin-5'-phosphat, Dinatriumsalz 2 H₂O

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Antikataraktikum N jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Antikataraktikum N und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Antikataraktikum N beachten?
3. Wie ist Antikataraktikum N anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Antikataraktikum N aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Antikataraktikum N und wofür wird es angewendet?

Antikataraktikum N dient der unterstützenden Behandlung des grauen Stars.

Antikataraktikum N wird angewendet zur unterstützenden Behandlung bei Linsentrübungen und Anpassungsschwächen des Auges.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Antikataraktikum N beachten?

Antikataraktikum N darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Inosin-5'-phosphat, Dinatriumsalz 2 H₂O oder einen der sonstigen Bestandteile von Antikataraktikum N sind.

Bei Anwendung von Antikataraktikum N mit anderen Arzneimitteln:

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Hinweis:

Falls Sie zusätzlich andere Augentropfen oder Augensalben anwenden, sollten Sie einen zeitlichen Abstand von 15 Minuten zwischen den Anwendungen der einzelnen Präparate einhalten. Augensalben sollten Sie stets als letztes anwenden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Ausreichende Erfahrung über die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegt nicht vor. Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Antikataraktikum N

Während der Anwendung von Antikataraktikum N sollten keine Kontaktlinsen getragen werden. Wenn keine Einwände gegen das Tragen von Kontaktlinsen bestehen, sollten vor dem Eintropfen des Präparates in den Bindehautsack die Kontaktlinsen vom Auge genommen werden und nach etwa 15 Minuten wieder aufgesetzt werden. Wegen der Gefahr einer Materialbeeinflussung muss eine direkte Berührung mit weichen Kontaktlinsen ausgeschlossen werden.

3. Wie ist Antikataraktikum N anzuwenden?

Wenden Sie Antikataraktikum N immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Bitte fragen Sie Ihren Arzt um Rat, wenn sich die Symptome verschlimmern.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:


3 mal täglich einen Tropfen in den Bindehautsack eintropfen.

Verteilen Sie die Anwendung von Antikataraktikum N gleichmäßig über den Tag.

Waschen Sie sich gründlich die Hände vor Anwendung der Augentropfen. Augentropfen sollten grundsätzlich so angewendet werden, dass ein Kontakt der Tropferspitze mit Auge oder Gesichtshaut vermieden wird. Schrauben Sie die Schutzkappe ab, legen Sie den Kopf etwas zurück, ziehen Sie das Unterlid etwas vom Auge ab und bringen Sie durch leichten Druck auf die Flasche einen Tropfen in den Bindehautsack ein. Schließen Sie langsam die Augenlider. Nach Gebrauch soll die Flasche wieder sorgfältig verschlossen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker,





wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Antikataraktikum N zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Antikataraktikum N angewendet haben, als Sie sollten

sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Setzen Sie Ihre Behandlung in der üblichen Dosis fort.

Wenn Sie die Anwendung von Antikataraktikum N vergessen haben,

wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, sondern holen Sie die Anwendung so schnell wie möglich nach und dosieren Sie anschließend wie oben angegeben bzw. von Ihrem Arzt verordnet weiter.

Wenn Sie die Anwendung von Antikataraktikum N abbrechen,

nehmen Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Antikataraktikum N Nebenwirkungen haben.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandelte von 10	Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000	Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten: weniger als 1 Behandelte von 10.000	

Nicht bekannt:

Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Mögliche Nebenwirkungen:

In sehr seltenen Fällen kann vorübergehendes leichtes Augenbrennen auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn die aufgeführte Nebenwirkung Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

5. Wie ist Antikataraktikum N aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Nicht über 25 °C lagern.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch

Antikataraktikum N ist nach Anbruch 6 Wochen verwendbar.

6. Weitere Informationen

Was Antikataraktikum N enthält:

Der Wirkstoff ist Inosin-5'-phosphat, Dinatriumsalz 2 H₂O 1,0 mg/ml.

Die sonstigen Bestandteile sind Chlorhexidinbis (D-gluconat) (Konservierungsmittel), Sorbitol (Ph. Eur.), Wasser für Injektionszwecke

Wie Antikataraktikum N aussieht und Inhalt der Packung:

Antikataraktikum N sind klare, farblose Augentropfen, die in 10 ml Kunststoffflaschen abgefüllt sind. Jede Packung enthält entweder 1 oder 3 Kunststoffflaschen, jeweils mit Schraubverschluss.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
URSAPHARM, Industriestr., D-66129 Saarbrücken,
Tel.: 06805/92 92-0,
Fax: 06805/92 92-88, Email: info@ursapharm.de**

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im:

Oktober 2007

