



**Gebrauchsinformation:  
Information für den Anwender**

## **Posorutin® 50 mg/ml Augentropfen**

**Wirkstoff: Troxerutin**

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Posorutin® jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist **Posorutin®** und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von **Posorutin®** beachten?
3. Wie ist **Posorutin®** anzuwenden?

 **URSAPHARM**

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **Posorutin®** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. Was ist Posorutin® und wofür wird es angewendet?**

**Posorutin®** dient der Stabilisierung der Blutgefäße des Auges.

**Posorutin®** wird angewendet zur ergänzenden Behandlung bei Gefäßwandschwäche wie z. B. bei Veränderungen des Augenhintergrundes (Retinopathia diabetica) oder Unterblutungen der Bindehaut.

**Posorutin®** darf nur ergänzend zu anderen therapeutischen Maßnahmen wie z. B. einer Blutzuckerregulation bei Diabetes mellitus oder einer Laserbehandlung des Auges angewandt werden.

### **2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Posorutin® beachten?**

**Posorutin® darf nicht angewendet werden,**

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Troxerutin oder einen der sonstigen Bestandteile von **Posorutin®** sind.

**Bei Anwendung von Posorutin® mit anderen Arzneimitteln:**

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Hinweis:

Falls Sie zusätzlich andere Augentropfen oder Augensalben anwenden, sollten Sie einen zeitlichen Abstand von 15 Minuten zwischen den

Anwendungen der einzelnen Präparate einhalten. Augensalben sollten Sie stets als letztes anwenden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Ausreichende Erfahrung über die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegt nicht vor. Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Posorutin®**

Während der Anwendung von **Posorutin®** sollten keine Kontaktlinsen getragen werden. Wenn keine Einwände gegen das Tragen von Kontaktlinsen bestehen, sollten vor dem Eintropfen des Präparates in den Bindehautsack die Kontaktlinsen vom Auge genommen werden und nach etwa 15 Minuten wieder aufgesetzt werden. Wegen der Gefahr einer Materialbeeinflussung muss eine direkte Berührung mit weichen Kontaktlinsen ausgeschlossen werden.

### **3. Wie ist Posorutin® anzuwenden?**

Wenden Sie **Posorutin®** immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Bitte fragen Sie Ihren Arzt um Rat, wenn sich die Symptome verschlimmern.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

3 mal täglich einen Tropfen in den Bindehautsack eintropfen.





Verteilen Sie die Anwendung von **Posorutin**<sup>®</sup> gleichmäßig über den Tag. Die genaue Behandlungsdauer ist abhängig vom individuellen Krankheitsbild und muss vom Arzt festgelegt werden. **Posorutin**<sup>®</sup> ist für eine Dauertherapie geeignet.

Waschen Sie sich gründlich die Hände vor Anwendung der Augentropfen. Augentropfen sollten grundsätzlich so angewendet werden, dass ein Kontakt der Tropferspitze mit Auge oder Gesichtshaut vermieden wird. Schrauben Sie die Schutzkappe ab, legen Sie den Kopf etwas zurück, ziehen Sie das Unterlid etwas vom Auge ab und bringen Sie durch leichten Druck auf die Flasche einen Tropfen in den Bindehautsack ein. Schließen Sie langsam die Augenlider. Nach Gebrauch soll die Flasche wieder sorgfältig verschlossen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von **Posorutin**<sup>®</sup> zu stark oder zu schwach ist.

**Wenn Sie eine größere Menge Posorutin**<sup>®</sup> **angewendet haben, als Sie sollten** sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Setzen Sie Ihre Behandlung in der üblichen Dosis fort.

**Wenn Sie die Anwendung von Posorutin**<sup>®</sup> **vergessen haben,** wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, sondern holen Sie die Anwendung so schnell wie möglich nach und dosieren Sie anschließend wie oben angegeben bzw. von Ihrem Arzt verordnet weiter.

**Wenn Sie die Anwendung von Posorutin**<sup>®</sup> **abbrechen,** nehmen Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt oder

Apotheker.  
Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann **Posorutin**<sup>®</sup> Nebenwirkungen haben.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandelte von 10	Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000	Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten: weniger als 1 Behandelte von 10.000	
Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.	

#### Mögliche Nebenwirkungen:

In sehr seltenen Fällen können Überempfindlichkeit bzw. allergische Reaktionen auf einen der Bestandteile von **Posorutin**<sup>®</sup> auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn die aufgeführte Nebenwirkung Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

#### 5. Wie ist Posorutin<sup>®</sup> aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Nicht über 25 °C lagern.

**Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch Posorutin**<sup>®</sup> ist nach Anbruch 6 Wochen verwendbar.

#### 6. Weitere Informationen

##### Was Posorutin<sup>®</sup> enthält:

Der Wirkstoff ist Troxerutin 50 mg/ml  
Die sonstigen Bestandteile sind Chlorhexidinbis(D-gluconat) (Konservierungsmittel) 0,05 mg/ml Natriumchlorid; Natriumedetat (Ph. Eur.); gereinigtes Wasser

##### Wie Posorutin<sup>®</sup> aussieht und Inhalt der Packung:

**Posorutin**<sup>®</sup> ist eine klare, gelbe Lösung, die in 10 ml Kunststoffflaschen abgefüllt ist.

Jede Packung enthält 1 Kunststoffflasche mit Schraubverschluss.

##### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

URSAPHARM Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Industriestraße  
D-66129 Saarbrücken  
Tel.: 06805/92 92-0  
Fax: 06805/92 92-88  
Email: info@ursapharm.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im:

**September 2008**

