



**Gebrauchsinformation:  
Information für den Anwender**

# Sophtal-POS® N, 1 mg/ml, Augentropfen

**Wirkstoff: Salicylsäure (Ph.Eur.)**

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Sophtal-POS® N jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

## **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist **Sophtal-POS® N** und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von **Sophtal-POS® N** beachten?



3. Wie ist **Sophtal-POS® N** anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **Sophtal-POS® N** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. Was ist Sophtal-POS® N und wofür wird es angewendet?**

**Sophtal-POS® N** sind Augentropfen gegen Entzündungen des Auges.

**Sophtal-POS® N** wird angewendet zur symptomatischen Therapie bei Lidrandentzündungen (Blepharitiden), unspezifischen Bindehautentzündungen, Reizzuständen durch Staub, Rauch, Sonne. Bei infektiösen Erkrankungen nicht ohne adäquate antiinfektiöse Begleittherapie.

### **2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Sophtal-POS® N beachten?**

#### **Sophtal-POS® N darf nicht angewendet werden**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile von **Sophtal-POS® N** sind
- während Sie Kontaktlinsen tragen
- bei Augenverletzungen

Beachten Sie bitte, dass eine Augenreizung oder eine Augenrötung häufig auch ein Zeichen für eine ernste Augenerkrankung sein kann und Sie daher einen Augenarzt befragen sollten.

Suchen Sie deshalb sofort den nächsten erreichbaren Augenarzt auf, wenn eine der o.g. Situationen eintritt.

#### **Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Sophtal-POS® N ist erforderlich, wenn**

- die Augenrötung akut oder einseitig auftritt
- zu Ihren jetzigen Beschwerden Augen- oder Kopf-

schmerzen hinzukommen

- Sie eine Sehverschlechterung oder fliegende Punkte vor den Augen bemerken

### **Bei Anwendung von Sophtal-POS® N mit anderen Arzneimitteln:**

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Hinweis:**

Falls Sie zusätzlich andere Augentropfen oder Augensalben anwenden, sollten Sie einen zeitlichen Abstand von 15 Minuten zwischen den Anwendungen der einzelnen Präparate einhalten. Augensalben sollten Sie stets als letztes anwenden.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit:**

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

**Sophtal-POS® N** darf in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung durch den Arzt angewendet werden.

#### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Sie dürfen unmittelbar nach Anwendung von **Sophtal-POS® N** kein Fahrzeug führen, weil dieses Arzneimittel auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kurzfristig die Sehschärfe beeinflusst und somit das Reaktionsvermögen im Straßenverkehr. Sie dürfen dann auch vorübergehend keine Werkzeuge oder Maschinen bedienen.

### **3. Wie ist Sophtal-POS® N anzuwenden?**

Wenden Sie **Sophtal-POS® N** immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte





fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

4 mal täglich einen Tropfen in den Bindehautsack eintröpfen.

Verteilen Sie die Anwendungen von **Sophtal-POS® N** gleichmäßig über den Tag.

**Sophtal-POS® N** sollte bis zum Abklingen der Beschwerden angewendet werden. Die genaue Behandlungsdauer bestimmt der Arzt. Eine Anwendung über 14 Tage sollte in der Regel nicht erfolgen. Eine Daueranwendung sollte nur unter ärztlicher Kontrolle erfolgen.

Augentropfen sollten grundsätzlich so angewendet werden, dass ein Kontakt der Tropferspitze mit Auge oder Gesichtshaut vermieden wird. Schrauben Sie die Schutzkappe ab, legen Sie den Kopf etwas zurück, ziehen Sie das Unterlid etwas vom Auge ab und bringen Sie durch leichten Druck auf die Flasche einen Tropfen in den Bindehautsack ein. Schließen Sie langsam die Augenlider. Nach Gebrauch soll die Flasche wieder sorgfältig verschlossen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von **Sophtal-POS® N** zu stark oder zu schwach ist.

**Wenn Sie eine größere Menge Sophtal-POS® N angewendet haben, als Sie sollten,** sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Setzen Sie Ihre Behandlung in der üblichen Dosis fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann **Sophtal-POS® N** Neben-

wirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandler von 10	Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000	Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten: weniger als 1 Behandler von 10.000	
Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.	

#### Mögliche Nebenwirkungen:

In sehr seltenen Fällen können allergische Hautreaktionen oder Kontaktallergien, gelegentlich leichtes Augenbrennen auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

#### 5. Wie ist Sophtal-POS® N aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Nicht über 25 °C lagern.

#### Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch

Sie dürfen **Sophtal-POS® N** nach Anbruch nur 4 Wochen verwenden.

#### 6. Weitere Informationen

##### Was Sophtal-POS® N enthält:

Der Wirkstoff ist Salicylsäure (Ph.Eur.) 1,0 mg/ml. Die sonstigen Bestandteile sind Chlorhexidindigluconat-Lösung (Ph.Eur.), Borsäure, Natriumtetraborat · 2 H<sub>2</sub>O, Natriumchlorid, Natriumedetat (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser.

##### Wie Sophtal-POS® N aussieht und Inhalt der Packung:

**Sophtal-POS® N** sind klare, farblose Augentropfen, die in 10 ml Kunststoffflaschen abgefüllt sind. Jede Packung enthält entweder 1 oder 3 Kunststoffflaschen, jeweils mit Schraubverschluss.

##### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

URSAPHARM  
Industriestraße  
D-66129 Saarbrücken  
Tel.: 06805/92 92-0  
Fax: 06805/92 92-88  
Email: info@ursapharm.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im:

**Januar 2007**

Weitere Darreichungsform:

**Sophtal-POS® N Augenbad** mit 200 ml Lösung und beiliegender Augenbadewanne

